



Beipackzettel online - ein Service Ihrer Versandapotheke mycare.
mycare.de
ONLINE-APOTHEKE

Pharmazeutische Fachkräfte unserer Apotheke beraten Sie gern zu Fragen
rund um das Produkt - per E-Mail: service@mycare.de oder per Telefon:
0800-8770120 gebührenfrei. Alle Informationen: www.mycare.de

Zum Produkt ➤

BAUSCH + LOMB

Artelac™ Complete MDO®

0,24 % Natriumhyaluronat, Carbomer, Glycerol, Lipidkomponente (mittelkettige Triglyceride), Natriumhydroxid und Wasser für Injektionszwecke

Verwendungsziel: Augenbefeuhtung

Was ist Artelac® Complete MDO®?

Artelac® Complete MDO® ist eine milchige Augentropfenlösung, die 0,24 % Hyaluronsäure (als Natriumhyaluronat), Carbomer, Glycerol, eine Lipidkomponente (mittelkettige Triglyceride), Natriumhydroxid und Wasser für Injektionszwecke enthält. Die innovative Formulierung weist eine sehr gute Verträglichkeit auf, da sie frei von Konservierungsstoffen und Puffern ist. Nach dem ersten Öffnen kann das Produkt 6 Monate verwendet werden.

Wofür wird Artelac® Complete MDO® angewendet?

Artelac® Complete MDO® ist ein Augenbefeuhtungsmittel, das alle drei Schichten des Tränenfilms ergänzt, um die Befeuchtung der Augenoberfläche bei Trockenheitsgefühl zu verbessern.

Wann sollten Sie Artelac® Complete MDO® anwenden?

Artelac® Complete MDO® enthält den natürlichen Feuchtigkeitsspender Hyaluronsäure (als Natriumhyaluronat), der in den Strukturen eines gesunden menschlichen Auges und des natürlichen Tränenfilm vorkommt, sowie zwei weitere Feuchtigkeitsspender: Glycerol und Carbomer. Daneben enthält Artelac® Complete MDO® zusätzlich eine Lipidkomponente und ergänzt somit alle drei Schichten des Tränenfilms: die Lipidschicht, die wässrige Schicht und die Muzinschicht.

Artelac® Complete MDO® ist so konzipiert, dass es auf der Augenoberfläche verbleibt und intensive Feuchtigkeit spendet, um Symptome sofort und langlehanthaft zu lindern. Das Produkt eignet sich für alle, die unter verschiedenen Symptomen von trockenen Augen leiden, wie z. B. müde, gestresste, gereizte, brennende und/oder tränende Augen.

Wie oft und wie lange sollte Artelac® Complete MDO® angewendet werden?


Geben Sie nach Bedarf einen Tropfen Artelac® Complete MDO® ins Auge. Sie können die Tropfen täglich und so oft anwenden, wie Sie möchten. Die Anwendungsdauer ist nicht begrenzt.

Textarea 128 x 400

Wie ist Artelac® Complete MDO® anzuwenden?

Durch den patentierten Pumpmechanismus von Artelac® Complete MDO® benötigt die Augentropfenlösung keine Konservierungsstoffe.

Allgemeiner Hinweis: Waschen Sie sich vor jeder Anwendung die Hände. Vermeiden Sie den Kontakt der Flaschenspitze mit Ihren Fingern oder Augen, um eine mögliche Verunreinigung der Lösung oder Augenverletzungen zu verhindern.



Aufgrund des Flaschendesigns verbleibt eine kleine Menge Lösung in der Flasche. Das angegebene Füllvolumen kann jedoch vollständig aus der Flasche entnommen werden.

Wann sollte Artelac® Complete MDO® nicht angewendet werden?

Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn Sie auf einen der Inhaltsstoffe empfindlich reagieren.

Wichtige Informationen zur Anwendung von Artelac® Complete MDO®

- In sehr seltenen Fällen können lokale Überempfindlichkeitsreaktionen auftreten. In diesen Fällen muss die Behandlung beendet werden. Wenn anhaltendes Unbehagen oder Irritationen auftreten, brechen Sie die Anwendung des Produkts ab und wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Nach dem Einträufeln des Produkts kann kurzzeitig verschwommene Sicht auftreten, die zu Beeinträchtigungen beim Führen von Fahrzeugen oder bei der Bedienung von Maschinen führen kann.
- Berühren Sie die Augenoberfläche nicht mit der Flaschenspitze, um mögliche Verletzungen der Augenoberfläche oder eine Verunreinigung der Lösung zu vermeiden.
- Berühren Sie die Flaschenspitze nicht mit den Fingern, um eine mögliche Verunreinigung der Lösung zu vermeiden.
- Geben Sie die Flasche nach dem Öffnen nicht an andere Personen für deren Gebrauch weiter.
- Unvorsichtiger Gebrauch des Produkts entgegen der Gebrauchsanweisung kann dazu führen, dass das Produkt aus der Hand rutscht und Augenverletzungen verursacht.
- Nehmen Sie Kontaktlinsen vor der Anwendung heraus.
- Warten Sie nach der Anwendung ungefähr 15 Minuten, bevor Sie ein anderes Produkt am Auge anwenden oder Ihre Kontaktlinsen wieder einsetzen.
- Entsorgen Sie das Medizinprodukt 6 Monate nach dem ersten Öffnen.
- Nach dem Verwendbarkeitsdatum nicht mehr verwenden.
- Nicht verwenden, wenn die Verpackung oder Flasche beschädigt ist.
- Artelac® Complete MDO® enthält Kleinteile aus Plastik, die von Kindern verschluckt werden könnten. Erstickungsgefahr. Daher muss Artelac® Complete MDO® für Kinder unzugänglich aufbewahrt werden.
- Für die Anwendung dieses Produkts ist keine spezielle Schulung erforderlich.
- Nach derzeitigen Kenntnisstand kann dieses Produkt bei schwangeren Frauen, stillenden Müttern und Kindern eingesetzt werden.
- Wenn Ihr Kind unter trockenen Augen leidet, sprechen Sie vor der Anwendung eines Augenbefeuhtungsmittels mit einem Arzt.

Wie ist Artelac® Complete MDO® zu lagern?

Lagern Sie das Produkt bei +1 °C und +25 °C.

Dank des Flaschendesigns kann Artelac® Complete MDO® nach dem Öffnen 6 Monate verwendet werden.

Entsorgung: Das Produkt ist entsprechend den örtlichen Bestimmungen zu entsorgen.

In Verbindung mit dem Produkt auftretende schwerwiegende Vorfälle sollten dem Hersteller und der zuständigen Behörde gemeldet werden.

Packungsgrößen: Artelac® Complete MDO® ist in Packungen mit jeweils 3 ml (Probe), 10 ml und 2 x 10 ml 10 ml Augentropfen erhältlich.

Artelac® Complete ist zudem in praktischen, konservierungsmittelfreien Ein-Dosis-Ophthiolen erhältlich.

Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi, il contient des informations importantes pour l'utilisation de ce produit. Si vous avez des questions, veuillez vous adresser à votre professionnel de santé – votre pharmacien, votre médecin, votre ophtalmologue, ou vous mettre en relation avec l'information médicale.

BAUSCH + LOMB

Artelac™ Complete MDO®

2,4 mg/ml d'hyaluronate de sodium, carbomère, glycerol, composant lipidique (triglycérides à chaîne moyenne), hydroxyde de sodium et eau pour injection

Indications: Hydratation de l'œil.

Qu'est-ce que Artelac® Complete MDO®?

Artelac® Complete MDO® est une solution ophthalmique non translucide contenant 0,24 % d'acide hyaluronique (sous forme de sodium hyaluronate), du carbomère, du glycerol, un composant lipidique (triglycérides à chaîne moyenne), de l'hydroxyde de sodium et de l'eau pour injection.

La formulation présente une très bonne tolérance car elle ne contient ni conservateur ni substance tampon.


Grâce à son flacon sans conservateur, Artelac® Complete MDO® s'utilise facilement et de façon sécurisée. Artelac® Complete MDO® se conserve 6 mois après ouverture.

Consignes d'utilisation: Artelac® Complete MDO® est une solution ophthalmique qui renforce les trois couches du film lacrymal pour améliorer l'hydratation de la surface oculaire en cas de sensation de sécheresse oculaire.

Quand utiliser Artelac® Complete MDO®?

Artelac® Complete MDO® dispose d'un mécanisme de pompe breveté permettant de ne pas inclure d'agent conservateur. Il est possible que ce flacon soit différent de ceux que vous avez pu utiliser dans le passé.

Note générale: Lavez-vous les mains avant chaque utilisation. Évitez tout contact entre l'embot du flacon et vos doigts ou la surface de votre œil afin d'éviter tout risque de contamination de la solution ou de blessure de l'œil.



Fermez l'œil et tournez-le doucement afin de diffuser la solution uniformément à la surface de votre œil.

5. Immédiatement après utilisation, secouez le flacon pour éliminer les éventuelles gouttes résiduelles et replacez le bouchon protecteur blanc transparent sur l'embot du flacon.

En raison de la conception du flacon, il reste un peu de solution dans le flacon. Cependant, on peut entièrement vider le flacon du volume de remplissage déclaré.

Quand ne faut-il pas utiliser Artelac® Complete MDO®?

N'utilisez pas ce produit en cas d'hypersensibilité à l'un des ingrédients

Informations importantes concernant l'utilisation de Artelac® Complete MDO®

- Des réactions d'hypersensibilité locale ont été très rarement rapportées. Dans ce cas, le traitement doit être interrompu. Si vous ressentez une gêne ou une irritation persistante, arrêtez d'utiliser le produit et consultez votre médecin ou votre professionnel de santé.
- Ce produit peut provoquer des troubles temporaires de la vision après l'instillation, ce qui entraîne un risque potentiel pour les conducteurs de véhicules ou les opérateurs de machines.
- Veuillez noter qu'avant la première utilisation ou après une période de non-utilisation, un premier pompage du flacon s'avère nécessaire. En même temps, maintenez l'embout compte-gouttes orientée vers le bas et loin des yeux, tel qu'ilustré à la figure 2.
- Évitez de toucher la surface de l'œil avec l'embout du flacon afin d'éviter toute blessure de la surface de l'œil ou une contamination de la solution.
- Évitez de toucher l'embout du flacon avec les doigts afin d'éviter une contamination de la solution.
- Une fois ouvert, ne partagez pas le flacon avec d'autres personnes.
- Une mauvaise utilisation du produit, contraire aux instructions d'utilisation, peut provoquer le glissement du flacon de votre main et causer des blessures à l'œil.

Conservation: À conserver à une température comprise entre +1°C et +25°C.

Le flacon est conçu de sorte que vous puissiez utiliser Artelac® Complete MDO® pendant 6 mois après ouverture.

Élimination: Le produit doit être éliminé conformément aux réglementations locales.

Tout incident grave dû à l'utilisation de ce produit doit être signalé au fabricant et à l'autorité compétente.

Conditionnement: Artelac® Complete MDO® Est disponible en flacons de 3 ml (échantillons), 10 ml et 2 x 10 ml.

Artelac® Complete MDO® est également disponible en boîtes de doses uniques pratiques et sans conservateur.

Leggere attentamente queste istruzioni per l'uso e conservare le informazioni importanti su come usare il prodotto. Per qualsiasi domanda, rivolgersi al tuo farmacista, al medico, all'ottico oppure contattateci.

IT

BAUSCH + LOMB

Artelac™ Complete MDO®

0,24% ialuronato di sodio, carbomer, glicerolo, componente lipidica (trigliceridi a catena media), idrossido di sodio e acqua per preparazioni iniettabili.

Uso previsto: soluzione oculare idratante.

Che cos'è Artelac® Complete MDO®?

Artelac® Complete MDO® è una soluzione oftalmica opaca contenente lo 0,24% di acido ialuronico (come ialuronato di sodio), carbomer, glicerolo, una componente lipidica (trigliceridi a catena media), idrossido di sodio e acqua per preparazioni iniettabili. La sua formulazione tecnologicamente avanzata possiede un'altissima tollerabilità in quanto priva di conservanti e di sostanze tamponanti.

La soluzione oculare è contenuta in un flacone multidose senza conservanti (PFMD), sicuro e facile da usare. Dopo l'apertura della confezione, il prodotto può essere utilizzato per 6 mesi.

Indicazioni per l'uso: Artelac® Complete MDO® è un lubrificante oculare che agisce su tutti e tre gli strati del film lacrimale per incrementare l'idratazione della superficie oculare in presenza di sensazione di seccchezza oculare.

Quando usare Artelac® Complete MDO®?

Artelac® Complete MDO® è ispirato alla struttura del film lacrimale naturale. Contiene acido ialuronico (come ialuronato di sodio), un idratante naturale, che si trova nelle strutture di un occhio umano sano e nel film lacrimale naturale, unitamente a due sostanze umettanti: glicerolo e carbomer. Contenendo un'ulteriore componente lipidica (trigliceridi a catena media), Artelac® Complete MDO® agisce su tutti e tre gli strati del film lacrimale: la fase lipidica, quella acquosa e quella mucinica.

Artelac® Complete MDO® è progettato per rimanere sulla superficie dell'occhio fornendo un'intensa idratazione per un sollievo immediato e duraturo. È un prodotto adatto a coloro che soffrono dei sintomi tipici della seccchezza oculare come occhi stanchi, stressati, con sensazione di corpo estraneo, che bruciano e/o lacrimano.

Come frequenza e per quanto tempo utilizzare Artelac® Complete MDO®?

Instillare una goccia di Artelac® Complete MDO® nell'occhio in base alle esigenze. Può essere utilizzato ogni giorno e più volte al giorno, con la frequenza desiderata. Non vi è alcun limite per la durata di utilizzo.

Come usare Artelac® Complete MDO®?

Il meccanismo a pompa di erogazione brevettato di Artelac® Complete MDO® garantisce una soluzione oftalmica in gocce priva di conservanti, ma il flaoncino potrebbe avere un aspetto diverso rispetto a quelli da voi utilizzati in passato.

Nota generale: lavarsi le mani prima di ogni utilizzo. Evitare il contatto della punta del flaoncino con le dita o con gli occhi, per evitare ogni eventuale contaminazione della soluzione o lesione oculare.



1. Prima di ogni utilizzo, rimuovere il cappuccio protettivo bianco traslucido dalla punta del flaoncino con un movimento rotatorio.
 2. Attenzione! Al primo utilizzo e se il flaoncino non è stato usato per un certo periodo di tempo: orientare il flaoncino con la punta rivolta verso il basso e premere ripetutamente il meccanismo erogatore fino al rilascio di una goccia.
 3. Tenere il flaoncino come indicato: posizionare il pollice sull'apposito supporto ergonomico e impugnare la parte inferiore con le altre dita. Due dita devono essere posizionate sul fondo del flaoncino.
 4. Tenere il flaoncino con la punta rivolta verso il basso. Reclinare la testa leggermente all'indietro. Tirare delicatamente verso il basso la palpebra inferiore con un dito della mano libera, tenendo il flaoncino in posizione verticale sull'occhio. Premere delicatamente il meccanismo erogatore per applicare una goccia nell'occhio.
- Quindi chiudere l'occhio e battere la palpebra per consentire una distribuzione ottimale della goccia sulla superficie oculare. Immediatamente dopo l'uso, eliminare le eventuali gocce residue e riposizionare il cappuccio protettivo bianco traslucido sulla punta del flaoncino.
- Per via del design del flaoncino, una piccola quantità di soluzione rimane al suo interno. Tuttavia, il volume di riempimento specificato viene interamente erogato.

Quando non utilizzare Artelac® Complete MDO®?

Non utilizzare il prodotto in caso di ipersensibilità a uno degli ingredienti.

Informazioni importanti sull'utilizzo di Artelac® Complete MDO®

- Molto raramente sono state segnalate reazioni di ipersensibilità locale. In tali situazioni il trattamento va interrotto. In caso di fastidio o irritazione persistente, interrompere l'uso del prodotto e consultare il medico o specialista della salute.
- Questo prodotto può causare temporaneamente una visione offuscata dopo l'instillazione, con possibile impatto negativo sulla guida di veicoli o sull'utilizzo di macchinari.
- Si noti che prima del primo utilizzo o dopo un periodo di inutilizzo, è necessario azionare più volte l'erogatore del flaoncino. Mentre si esegue questa operazione, tenere la punta del contagocce rivolta verso il basso e lontano dagli occhi, come mostrato nella Figura 2.
- Non toccare la superficie oculare con il beccuccio erogatore per evitare qualsiasi possibile lesione oculare o contaminazione della soluzione.
- Evitare il contatto della punta del flaoncino con l'occhio o con le dita, per evitare contaminazioni della soluzione.
- Dopo l'apertura, non condividere il flaoncino con nessun altro.
- La manipolazione incorta del prodotto in contrasto con le istruzioni per l'uso potrebbe far scivolare il prodotto dalle mani e causare lesioni all'occhio.

Conservazione: Conservare a una temperatura compresa tra +1 e +25 °C.

Lo speciale flaoncino consente di utilizzare Artelac® Complete MDO® per 6 mesi dopo prima apertura.

Smaltimento: Il prodotto deve essere smaltito conformemente alle normative locali.

Qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al prodotto deve essere segnalato al produttore e all'autorità competente.

Presentazione: Artelac® Complete MDO® è disponibile in confezioni da 3 ml come campione, da 10 ml e 2 x 10 ml di soluzione oftalmica.

Artelac® Complete MDO® è disponibile anche nelle comode unità monodose (SDU) senza conservanti.

Symbolerklärung / Explication des symboles / Spiegazione dei simboli

	Kann nach dem ersten Öffnen 6 Monate lang verwendet werden / Après la première utilisation, le dispositif médical se conserve 6 mois. / Può essere utilizzato per 6 mesi dopo la prima apertura.		Sterilisiert mit aseptischem Verfahren und verpackt in einem einfachen Sterilbarrièresystem / Méthode de stérilisation aseptique et conditionné dans un système de barrière stérile unique / Sterilizzato con tecniche di lavorazione aseptiche e confezionato in un sistema sterile a barriera singola.		Achtung (wichtige Warnhinweise finden Sie in der Gebrauchsanweisung) / Attention: Consultez les instructions d'utilisation pour obtenir des informations importantes telles que des avertissements et des précautions d'emploi. / Attenzione: consultare le istruzioni per l'uso per importanti informazioni di avvertenza.
	Chargenbezeichnung / Numéro de lot / Codice lotto		Temperaturbegrenzung / Stockage du dispositif médical à une température comprise entre +1°C et +25°C / Limiti di temperatura		Verwendbar bis / Date de péremption – ne pas utiliser après la date de péremption / Data di scadenza
	Herstellungsdatum / Date de fabrication / Data di produzione		Gebrauchsanweisungen beachten / Lire les instructions d'utilisation / Consultare le istruzioni per l'uso		Einmalige Produktkennung GTIN (01) Produktkennung EXP (17) Verwendbar bis (Format: JJJMMTT)
	Nicht verwenden, wenn die Verpackung oder Flasche beschädigt ist / Ne pas utiliser si l'emballage ou le flacon est endommagé / Non utilizzare se la confezione o il flaoncino sono danneggiati.		Europäisches Konformitätsbewertungsverfahren für Medizinprodukte. CE-Befreiung mit Nummer der Benannten Stelle. / Evaluation européenne de la conformité des dispositifs médicaux. Marquage CE avec numéro de l'organisme notifié. / Valutazione europea della conformità dei dispositivi medici. Marchio CE con numero di Organismo Notificato.		LOT (10) Chargenbezeichnung / Identifiant unique de dispositif GTIN (01) identifiant de dispositif EXP (17) date limite de consommation (format: aammjj) LOT (10) numéro de lot / Identificazione univoca del dispositivo GTIN (01) identificazione del dispositivo EXP (17) data di scadenza (formato: aammmg) LOT (10) numero di lotto
	Medizinprodukt / Dispositif médical / Dispositivo medico		Hersteller / Fabricant / Fabbriante Dr. Gerhard Mann chem.-pharm. Fabrik GmbH Brunsbütteler Damm 165/173 15381 Berlin, Germany		