



Beipackzettel online - ein Service Ihrer Versandapotheke mycare.
Pharmazeutische Fachkräfte unserer Apotheke beraten Sie gern zu Fragen
rund um das Produkt - per E-Mail: service@mycare.de oder per Telefon:
0800-8770120 gebührenfrei. Alle Informationen: www.mycare.de

[Zum Produkt »](#)

Leviacelis

MIKROKLISTIER MIT PROMELAXIN

PATENTIERTE FORMEL



WIRKKOMPLEX
AUS HÖNIGEN UND
POLYSACCHARIDEN DER
ALOE UND DER MALVE

Exklusiver Balg
Easy Use
+ einfach anzuwenden

Doppelwirkung
Befreit den Darm, ohne zu reizen,
indem es die Rektumschleimhaut **schützt**

gluten
free

MEDIZINPRODUKT
Klasse IIb

Leviacelis ist ein **innovatives Mikroklistier auf Honigbasis**, das ausgewogen darmentleerend und gleichzeitig schützend und beruhigend auf die Rektumschleimhaut wirkt. Es ist geeignet zur Bekämpfung der Beschwerden, Reizung und Entzündung, die mit einer Verstopfung einhergehen.

Die **Doppelwirkung von Leviacelis** wird dank **PROMELAXIN** erreicht, einem Wirkkomplex aus Blüten- und Honigtauhonigen, die aufgrund ihres Gehalts an Monosacchariden, Polysacchariden und Melanoidinen sorgfältig ausgewählt und verarbeitet werden, angereichert mit der **Polysaccharidfraktion** aus Aloe und Malve.

WIRKUNGSWEISE

Leviacelis wirkt darmentleerend, ohne zu reizen und fördert damit die physiologische und ausgewogene Stimulierung des Stuhlgangs.

Durch seine schleimähnlichen Eigenschaften und Viskosität ahmt **Leviacelis** die Schmierwirkung von physiologischem Schleim nach und schützt so die Rektumschleimhaut beim Passieren des Stuhls.

Dank dieser Besonderheiten und der antioxidativen Eigenschaften schützt und beruhigt das Produkt die Schleimhaut, indem es durch seine physischen Eigenschaften indirekt entzündungshemmend wirkt.

ANWENDUNGSGEBIETE

Leviacelis ist zur Behandlung von Verstopfung geeignet, auch bei Überempfindlichkeit des Darms (zum Beispiel bei Reizdarm), Analfissuren und Hämorrhoiden.

Das Produkt kann auch in der Schwangerschaft, Stillzeit und bei Säuglingen angewandt werden.

ZUSAMMENSETZUNG

Funktionelle Bestandteile 73,2 %


Promelaxin Wirkkomplex aus Honigen und Polysacchariden der Aloe und der Malve

Gehalt an: Monosacchariden $\geq 50\%$, Polysacchariden (Molekulargewicht > 20.000 Dalton) $\geq 0,3\%$


Enthält außerdem: Hydroglycerinmischung, Zitronensaft, ätherisches Öl aus Lavendel.

ANWENDUNGSHINWEISE

1) Mikroklistier durch Entfernen des Sicherheits-Kanülideckels öffnen



- Weißen Ring über dem Balg festhalten
- Mit der anderen Hand den Kanülideckel biegen, bis er durchbricht und sich vollständig vom Ring löst



- Kanülideckel herausziehen

2) Einige Tropfen des Produkts perianal auftragen und die Kanüle vorsichtig in das Rektum einführen.

3) Das Mikroklistier ganz ausdrücken und nach der Verabreichung zusammengedrückt halten, bis die Kanüle vollständig herausgezogen ist, um zu vermeiden, dass das Produkt wieder zurückgesaugt wird.



PATENTIERTE
FORMEL

Patent
Nr. 102012902100704

gluten
free

Geeignet für
Menschen mit
Zöliakie

LEVIACLIS ADULT



Packung mit 6 Mikroklistieren
zur einmaligen Anwendung mit
Kanülideckel für Erwachsene und
Jugendliche à 10 g

**Geeignet für Erwachsene und Jugendliche
ab 12 Jahren. Auch in der Schwangerschaft
und Stillzeit geeignet.**

DOSIERUNG

1 Mikroklistier à 10 g bei Bedarf.

**Bei hartnäckiger Verstopfung 2 Dosen
nacheinander verabreichen.**

LEVIACLIS PEDIATRIC



Packung mit 6 Mikroklistieren zur einmaligen Anwendung mit Kanülideckel für Kinder und Säuglinge à 5 g

Geeignet für Kinder und Säuglinge.

Zur einfacheren Verabreichung des Mikroklistiers wird empfohlen, das Kind links zu lagern, die Knie zum Bauch hin angezogen.



DOSIERUNG

Kinder von 3-12 Jahren:

1 Mikroklistier à 5 g bei Bedarf.

Bei hartnäckiger Verstopfung

2 Dosen nacheinander verabreichen.

Kinder von 1-3 Jahren:

1 Mikroklistier à 5 g bei Bedarf.

Säuglinge von 0-1 Jahren:

ein halbes Mikroklistier à 5 g bei Bedarf.

HINWEISE

Bei Überempfindlichkeit oder Allergie gegen einen oder mehrere Inhaltsstoffe nicht anwenden.

Bei länger andauernder Verstopfung muss ein Arzt hinzugezogen werden, um das Vorliegen anderer Erkrankungen auszuschließen.

Das Mikroklistier ist zur einmaligen Anwendung bestimmt, es darf also nach Verabreichung einer halben Dosis, wie bei Säuglingen, nicht nochmals verwendet werden.

Bei Zimmertemperatur aufbewahren und vor Hitze und Licht schützen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Das Verfallsdatum bezieht sich auf das ungeöffnete und ordnungsgemäß aufbewahrte Produkt.

VERFALLSDATUM

Siehe Verfallsdatum auf der Verpackung. Nach Ablauf des angegebenen Verfallsdatums nicht mehr verwenden.

VERKAUFSVERPACKUNG

Leviaclics Adult: 6 Mikroklistiere zur einmaligen Anwendung mit Kanülideckel für Erwachsene und Jugendliche à 10 g

Leviaclics Pediatric: 6 Mikroklistiere zur einmaligen Anwendung mit Kanülideckel für Kinder und Säuglinge à 5 g

VERSTOPFUNG

Der Begriff „Verstopfung“ bezeichnet eine längere Verweildauer des Stuhls im letzten Darmabschnitt. In diesem Fall ist der angesammelte Stuhl wegen der übermäßigen Flüssigkeitsresorption trocken und hart: Der Stuhl hat ein geringes Volumen, die Darmentleerung erfolgt **selten** (auch weniger als 3-mal pro Woche) und ist **erschwert und/oder schmerzhaft** (wegen des harten Stuhls). Manchmal äußert sich Verstopfung auch durch das Gefühl, sich trotz normaler Frequenz des Stuhlgangs nicht vollständig oder nur mit übermäßiger Anstrengung entleeren zu können.

URSACHEN

Die Hauptursachen für das Problem können in allen Altersstufen eine **ungesunde Lebensweise** (unausgewogene Ernährung, unzureichende Flüssigkeitszufuhr, obst- und gemüsearme Ernährung, Bewegungsmangel und sitzende Tätigkeit), **Änderung der persönlichen Gewohnheiten oder Klimabedingungen** (zum Beispiel auf Reisen), **Einnahme bestimmter Arzneimittel, Magen-Darm-Erkrankungen oder Stoffwechselstörungen** (wie Reizdarmsyndrom) oder **besondere Umstände wie Stress, Bewegungslosigkeit oder Bettlägerigkeit (vor allem bei älteren Menschen) sein.**

Hämorrhoiden, Analfissuren und Prolaps können Verstopfung verursachen oder eine Folge davon sein. Abführschwierigkeiten und lokale Reizungen bewirken einen Teufelskreis, der die Behebung der Verstopfung und die Verbesserung der damit verbundenen Beschwerden verhindert. Eine häufige Ursache für Verstopfung ist die **willentliche Unterdrückung des Stuhldrangs**, die vor allem bei Kindern im Alter von 2-3 Jahren vorkommt. Bei Kindern kann es **bei länger andauerndem Fieber** und daraus resultierender leichter Dehydrierung zu Verstopfung kommen.

NÜTZLICHE TIPPS

In vielen Fällen kann die Verstopfung durch eine wasser- und ballaststoffreiche Kost behoben werden: Ballaststoffe binden unterschiedlich viel Wasser und tragen so dazu bei, das Stuhlvolumen zu vergrößern. Außerdem ist regelmäßige körperliche Aktivität hilfreich.



www.leviaclics.de



0373

Letzte Überarbeitung: 02/2016



Aboca S.p.A. Società Agricola - Loc. Aboca, 20 - 52037 Sansepolcro (AR) - Italia
www.aboca.com

Unternehmen mit nach ISO 9001 und ISO 13485 zertifiziertem Qualitätsmanagementsystem und nach ISO 14001 zertifiziertem Umweltmanagementsystem.