



Beipackzettel online - ein Service Ihrer Versandapotheke mycare.
Pharmazeutische Fachkräfte unserer Apotheke beraten Sie gern zu Fragen
rund um das Produkt - per E-Mail: service@mycare.de oder per Telefon:
0800-8770120 gebührenfrei. Alle Informationen: www.mycare.de

[Zum Produkt »](#)

Wobe-Mucos®

Sehr geehrte/r Anwender/in von Wobe-Mucos®,

die Gabe von Enzymkombinationen ist seit vielen Jahrzehnten eine bewährte Möglichkeit, das Immunsystem zu unterstützen. Die bilanzierte Diät Wobe-Mucos® ist bestimmt zum Diätmanagement bei onkologischen Patienten während und nach einer Chemo- und/oder Strahlentherapie.

Die in Wobe-Mucos® verwendeten Enzyme Papain, Trypsin und Chymotrypsin liegen in hochaktiver Form vor. Diese Enzymaktivität wird in F.I.P.-Einheiten gemessen und stellt ein Qualitätskriterium dar. Eine Tablette Wobe-Mucos® enthält mindestens 1500 F.I.P.-Einheiten.

Verzehrempfehlung:

Während einer Chemo- und/oder Strahlentherapie sollen täglich 3 x 4 Tabletten Wobe-Mucos® verzehrt werden. Zur Aufrechterhaltung eines ausbalancierten und damit funktionierenden Immunsystems nach einer Chemo- und/oder Strahlentherapie kann der Verzehr auf 3 x 2 Tabletten Wobe-Mucos® täglich reduziert werden. Die Tabletten mit reichlich Flüssigkeit unzerkaut verzehren. Damit die Enzyme optimal aufgenommen werden können, ist es erforderlich, dass Wobe-Mucos® außerhalb der Mahlzeiten verzehrt wird. Es hat sich bewährt, einen Abstand von mindestens 30 Minuten vor oder mindestens 90 Minuten nach einer Mahlzeit einzuhalten. Eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise sind wichtig.

Bestandteile:

6 Tabletten enthalten:	mg
Papain (Papaya)	324
Trypsin (Rind, Schwein)	348
Chymotrypsin (Rind)	180

Zutaten:

Füllstoff Cellulose; Papain (enthält **Sulfite**); Trypsin; Chymotrypsin; Füllstoff Hydroxypropylcellulose; Trennmittel Magnesiumsalze von Speisefettsäuren und Siliciumdioxid; Cocosöl; Überzugsmittel Natriumalginat, Ethylcellulose und Fettsäuren.

Allergiker-Hinweis:

Dieses Produkt enthält Stoffe aus der Papaya.

Gleichzeitige Anwendung von Medikamenten, die die Blutgerinnung beeinflussen (Antikoagulantien und/oder Thrombozytenaggregationshemmer), darf nur nach sorgfältigem Abwägen des Nutzen-Risiko-Verhältnisses und unter ärztlicher Kontrolle erfolgen.

Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren.

Nicht über 25 °C aufbewahren.

Vor Licht und Feuchtigkeit schützen.

Bei Fragen zu Wobe-Mucos® stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

